






ITINERARIO DE VACUNACIÓN PARA ADULTOS 2019

Vacuna	19 – 21 AÑOS	22 – 26 AÑOS	27 – 49 AÑOS	50 – 64 AÑOS	≥65 AÑOS
Influenza inactivada (IIV) Influenza recombinante (RIV) ó Influenza (virus vivo atenuado) (LAIV)	1 dosis anual				
Tétanos, difteria, pertusis (Tdap o Td)	1 dosis Tdap, luego Td cada 10 años				
Sarampión común, Sarampión alemán, Paperas (MMR)	1 o 2 dosis (nacidos en 1957 o después)				
Varicela (VAR)	2 dosis (nacidos en 1980 o después)				
Zoster (recombinante) (RZV) (preferida) ó Zoster (virus vivo) (ZVL)				2 dosis	
				1 dosis	
Virus Papiloma Humano (VPH) Mujeres	2 o 3 dosis dependiendo de la edad en la primera dosis				
Virus Papiloma Humano (VPH) Hombres	2 o 3 dosis dependiendo de la edad en la primera dosis				
Neumococo conjugada (PCV13)					1 dosis
Neumococo polisacárida (PPSV23)	1 o 2 dosis dependiendo de la indicación				1 dosis
Hepatitis A (HepA)	2 o 3 dosis dependiendo la vacuna				
Hepatitis B (HepB)	2 o 3 dosis dependiendo la vacuna				
Meningococo A,C,W,Y (MenACWY)	1 o 2 dosis dependiendo de la indicación, luego refuerzo cada 5 años si el riesgo permanece				
Meningococo B (MenB)	2 o 3 dosis dependiendo de la vacuna e indicación				
Haemophilus influenzae tipo b (Hib)	1 o 3 dosis dependiendo de la indicación				

 La vacunación recomendada para adultos que cumplen con los requisitos de edad, falta de documentación de vacunación, o carecen de evidencia de infección del pasado

 La vacunación recomendada para adultos con un factor de riesgo adicional u otra indicación

 No recomendación